

세 정 코 주

(은 행 엽 엑 스)

■ 성분·함량 : 1앰플(5ml) 중

은행엽엑스(DAB)

17.5mg

■ 성 상 : 옅은 갈색의 투명한 액이 충전된 갈색의 유리 앰플제

■ 효능·효과

- 1) 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애 : 지적 및 감각능력저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력감퇴, 불안, 우울감, 내이성난청, 혈관성·대사성 경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하
- 2) 동맥경화성 혈관증, 고지 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색질환 또는 간혈성파행증) 폐색성 혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애등과 같은 말초동맥순환장애

■ 용법·용량

- 1일 5 ~ 10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥 주사한다.
- 급성치료시 : 1일 25밀리리터를 정맥주사 또는 점적정주한다
- 중증치료시 : 1일 25-50밀리리터를 정맥주사 또는 점적정주 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있는 가능성이 있는 여성

3. 이상반응

- 1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알려지지 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알려지성 피부증상이 일어날 수 있다.
- 2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 속 등이 관찰된다.
- 3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사증상이 나타날 수 있다.

4. 기타

이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 5ml x 지사포장단위

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 031-354-3187~8에서 확인할 수 있음.

재 조 원 건강과 미래를 생각하는



세정제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 907-7

소비자상담 (031)354-3187~8