

말초작용성 진해제

레부날 정

(레보드로프로피진 60mg)

기침은 외부로부터 흡입된 이물질을 배출하려는 정상적인 인체의 방어기전 중 하나이지만, 기도의 과민성으로 인하여 계속되는 기침은 환자에게 고통과 불편을 주며, 기존질환을 더욱 악화시키기도 합니다.

레부날 정은 레보드로프로피진을 주성분으로 하는 말초성 진해제로서, 이전에 흔히 사용되던 중추성 진해제에 비해 졸음 등의 중추성부작용을 줄인 약물입니다. 단순히 기침을 억제하는 것뿐만 아니라, 타키키닌(tachykinins)에 의한 기관지수축 및 염증, 점액과다분비 또한 억제하므로, 호흡기능에는 영향을 주지 않고 불필요한 기침을 억제하는 대중적 치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중

레보드로프로피진(별규) 60mg

【약리작용 및 특징】

1. **레부날 정**은 기침반사에 관여하는 말초신경 중 C-fiber의 활성을 억제합니다.
2. **레부날 정**은 C-fiber로부터 Substance-P를 비롯한 타키키닌의 분비를 감소시켜, 그로 인한 기관지수축 및 염증, 점액과다분비 등을 억제합니다.
3. **레부날 정**은 정상적인 호흡기능에는 영향을 미치지 않고, 불필요한 기침을 억제합니다.
4. **레부날 정** 말초에 작용하는 진해제이므로, 중추성진해제에 비해 진정, 졸음 등이 적게 나타납니다.

【성 상】 흰색의 원형정제

【효능·효과】

기침 : 급 · 만성 기관지염

【용법·용량】

성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것
이약에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
심각한 심부전 환자
3. 이상반응
1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
3) 순화기계 : 두근거림
4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작 시 주의할 것
5. 임부 및 수유부예의 사용
임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말 것
6. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 300 정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 최신의 정보확인 방법 : 이 첨부문서 작성일자(2007. 8. 10) 이후 변경된 내용은 아래에 표시된 홈페이지나 고객센터를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. (K-1)



제조판매원

진양제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 [T:(02)3470-0300]
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 [T:(031)494-8196]
고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com