



건강한 잇몸을 위한 잇몸질환치료제

덴타하이 캡슐

분류번호: 231(치과구강용약)

성분 · 함량 1캡슐 중

아스코르빈산(KP)	150.0mg
염화리소짐(KPC)	30.0mg
카르바조크롬(KPC)	2.0mg
초산토코페롤50%(KPC)	10.0mg
(dl- α -초산토코페롤로서 5.0mg)	

성상 연분홍색의 분말이 든 상 · 하부 황색의 경질캡슐제

용법 · 용량 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.



- ※ 그림과 같이 캡슐 포장의 볼록한 부분을 화살표 방향으로 누르고 캡슐만 꺼내 복용합니다. 이때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

효능 · 효과 치은염 · 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적 · 부기 · 출혈 · 통증)의 완화

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 부작용
 - 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
 - 피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진 · 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 120캡슐, 240캡슐

- ※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 이 설명서 작성일자(2007년 6월 7일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

제조원

(주)서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317

판매원

(주)유한양행

서울시 동작구 대방동 49-6