

잇몸질환 치료제

분류번호 : 231(치과구강용약) 일반의약품

영진 덴티나인 캡슐

YUNGJIN **Dentinine** Caps.

덴티나인 캡슐은 잇몸질환의 원인균에 대해 직접적인 살균효과가 있으며 모세혈관의 저항성 증가 및 투과성 억제로 출혈증상을 없애줍니다. 덴티나인 캡슐은 잇몸 조직의 혈액순환을 원활히 함으로써 손상된 잇몸에 수분을 공급하고 발적과 부종을 완화시킵니다. 또한 치조연골조직, 잇몸조직의 구성성분인 콜라겐의 생합성을 촉진하여 손상된 잇몸조직의 재생을 촉진하는 등 잇몸질환의 원인 및 증상들을 제거해 주므로 건강한 잇몸 유지에 필요한 잇몸질환 치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아스코르빈산(약전)	150mg
염화리소짐(식약청고시 제 98-127호)	30mg(역가)
카르바조크롬(식약청고시 제 98-127호)	2mg
초산토코페롤50%(식약청고시 제 98-127호)	10mg
(dl- α -초산토코페롤로서 5mg)	

【특·장점】

1. 덴티나인 캡슐은 모세혈관 보호 및 강화 작용을 통한 잇몸출혈 억제작용이 있습니다.
2. 덴티나인 캡슐은 신속한 소염 및 항균작용이 있어서 잇몸의 부기, 통증을 완화시킵니다.
3. 덴티나인 캡슐은 조직회복 촉진작용을 통한 콜라겐 합성을 촉진시켜 손상된 잇몸을 회복시킵니다.
4. 덴티나인 캡슐은 잇몸의 말초혈행 개선 작용을 통해 잇몸 조직에 영양을 원활하게 공급시킵니다.
5. 덴티나인 캡슐은 4가지 성분의 복합상승 작용을 통해 더 뛰어난 효과를 나타냅니다.

【성 상】 주황색의 가루가 든 상하부 노란색의 경질캡슐

【효능·효과】

치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화

【용법·용량】

성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
 - 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
3. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선의 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(외부포장 표기참조)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【문의전화】 본사 : (02)2041-8349

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

고객상담전화 : 080-990-8200(수신자 요금부담)

문서최초일 : 2005년 4월 6일

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 최초일자(2005년 4월 6일)이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자 상담실에서 확인할 수 있습니다.