




씨콜드[®]노즈정

비타민C 감기약

의약품 사용전에 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 설명서는 제품과 함께 보관하십시오.

코물, 코감기, 재채기는 급격한 기온변화, 바이러스, 알레르기를 일으키는 물질 등이 원인이 되어 코점막에 염증이 생겼을때 나타나는 주 증상입니다.



씨콜드 노즈정은 감기 증상을 제거 해 주는 양약 성분 외에 바이러스를 억제시키고, 면역을 증가시키는 비타민C를 1일 약 500mg 함유하여 감기증상(발열, 두통, 코물, 기침, 오한, 관절통, 근육통 등)을 해소시켜 줍니다.

말레인산클로르페니라민은 항알레르기 작용으로 재채기, 코물, 코막힘 등의 코감기 초기 증상을 해소시켜 줍니다.

[성분·함량]

주간용 : 1정(610.6mg)중

아세트아미노펜(약전)	200mg
DL-말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산슈도에페드린(유에스피)	15mg
무수카페인(약전)	8.33mg
아스코르빈산 과립97%(별규)	85.88mg
(아스코르빈산으로서 83.3밀리그램)	

야간용 : 1정(601.9mg) 중

아세트아미노펜(약전)	200mg
DL-말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산슈도에페드린(유에스피)	15mg
아스코르빈산 과립97%(별규)	85.88mg
(아스코르빈산으로서 83.3밀리그램)	

[성상]

주간용 : 적색의 원형 필름코팅정입니다. **야간용** : 연한 녹색의 타원형 필름코팅정입니다.

[효능·효과] 감기의 제증상 (코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]



주간용	1일 2회 식후 30분, 1회에 다음 용량을 복용하십시오
	15세 이상:1회 2정, 11~14세:1회 1~1½정, 7~10세:1회 1정
야간용	1일 1회, 마지막으로 씨콜드노즈 주간용을 복용한지 6시간 경과 후 다음 용량을 복용하십시오
	15세 이상:1회 2정, 11~14세:1회 1~1½정, 7~10세:1회 1정

[사용상의 주의사항]

1. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

2. 복용시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 손과 발이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 및 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우

- 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
3. 다음의 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 3) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 4) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
 - 5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용 할 때 다음 사항을 주의 하십시오.
- 1) 음범, 음량을 잘 지키십시오.
 - 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.(진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등)
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
 - 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기 연용 하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 잘못된 사용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관하십시오.

【포장단위】 자사포장(외부용기에 표시)단위 일니다.

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효(사용)기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변패 등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부 고시(소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9



· 설명서 작성년월일 : 2005.06.14
· 설명서 개정년월일 : 2006.02.10
· 제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호 (080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.