



시콜드[®]코프_정

비타민C 감기약

의약품 사용전에 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 설명서는 제품과 함께 보관하십시오.



씨콜드 코프정은 감기 증상을 제거 해 주는 양약 성분 외에 바이러스를 약화시키고, 면역을 증가시키는 비타민C를 1일 약 500mg 함유하여 감기증상(발열, 두통, 콧물, 기침, 오한, 관절통, 근육통 등)을 해소시켜 줍니다.

【성분·함량】 - 1정(640.9mg) 중 -

아세트아미노펜 (약전)	200mg
구아니페네신 (약전)	40mg
염산슈도에페드린 (유에스피)	15mg
염산클로페라стин (제이피)	8mg
DL-염산메칠에페드린 (약전)	12mg
아스코르빈산 과립97% (별규)	85.88mg
(아스코르빈산으로서 83.3밀리그램)	

【성 상】 녹색의 원형 필름코팅정입니다.

【효능·효과】 감기의 증상상(기침, 가래, 인후통, 콧물, 코막힘, 재채기, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

1일 3회 식후 30분, 1회에 다음 용량을 복용하십시오

15세 이상: 1회 2정, 11~14세: 1회 1~1½정, 7~10세: 1회 1정

【사용상의 주의사항】

- 다음 사람은 복용하지 마십시오.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
- 복용 할 때 다음 사항을 주의 하십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 손과 발이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
 - 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 다음의 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
 - 녹내장 (예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람

- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용 할 때 다음 사항을 주의 하십시오.
 - 1) 용법, 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.(진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등)
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
 - 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기 연용 하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 잘못된 사용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관하십시오.

【포장단위】 자사포장(외부용기에 표시)단위 입니다.

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효(사용)기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변패 등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부 고시(소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9



- 설명서 작성년월일 : 2005.06.14
- 설명서 개정년월일 : 2006.02.10
- 제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호 (080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.