



게프론 코큐텐 정

(코엔자임Q10)

일반의약품

항산화 성분 코큐텐 • 영양제

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.

사용설명서를 반드시 제때과 함께 보관하십시오.

【성분·함량】-1정(628mg)중-

코엔자임Q10(유비데카놀) (약전)	5.00mg
셀레늄 함유 건조효모(KPC)	97.222mg
(셀레늄으로서 52.5마이크로그램)	
아스코르빈산과립(9%)(별규)	77.32mg
(아스코르빈산으로서 75밀리그램)	
팔미틴산레티놀과립(KPC)	5.0mg
(비타민A로서 2500IU)	
50% 초산토코페롤 (KPC)	50.0mg
(비타민 E로서 25IU)	
산화아연(약전)(아연으로서 7.5mg)	9.35mg
황산칼륨(약전)(칼륨으로서 2.5mg)	5.57mg
(총칼륨으로서 2.55mg)	
에르고칼스테롤과립(KPC)	0.236mg
(비타민D로서 200IU)	
질산치아민(약전)	12.50mg
리보플라빈3배산(KPC)	15.015mg
(리보플라빈으로서 5mg)	
염산피리독신3배산(KPC)	3.003mg
(염산피리독신으로서 1mg)	
0.1% 시아노코발라민 (KPC)	2.50mg
(시아노코발라민으로서 2.5마이크로그램)	
판토텐산칼슘(약전)	15.00mg
니코틴산 아미드(약전)	10.00mg
염산	0.20mg
무수인산일수소칼슘(유.에스.피)	181.45mg
(칼슘으로서53.5mg) (총칼슘으로서 54.71mg)	
요오드화칼륨(약전)	0.196mg
(칼륨으로서 46마이크로그램)	
푸마르산철(유.에스.피) (철로서 7.5mg)	22.82mg
산화마그네슘(약전)(마그네슘으로서 3mg)	4.975mg
산화제이동(KPC)(구리로서 1.5mg)	1.875mg
황산망간일수화물(유.에스.피)	3.08mg
(망간으로서 1.0mg)	

【성 성】 연한 옐로우색의 타원형 필름코팅정입니다.

【효능·효과】 1. 다음의 경우 비타민 보충 : 육체피로, 병중 · 병후 체력저하, 임신 · 수유기, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민들이 효과

- 다혈증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 경통 등) - 각기, 눈의 피로
- 눈의 건조증의 완화, 야맹증 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방 - 아연의 보충

【용법·용량】 성인 1일 2회 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용합니다.

【사용상 주의사항】

1. 경고

- 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5000IU/일 이상투여하지 마십시오. 비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 6세이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

- 과칼혈증(hypercalcemia; 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자분, 유양증, 신진화환자분
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자분 3) 12개월미만의 영아 4) 과칼혈 증환자분
- 혈소판병 6) 혈액소변(혈대사이상으로 철이 간장, 폐장에 침착하는 질환) 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 신결석환자분 8) 중증의 신부전 환자분 9) 임부

3. 다음 환자는 복용전 의사 또는 약사와 상의해서 신중히 복용 하십시오

- 의사의 치료를 받고 있는 환자분
- 햇빛을 많이보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 과수산노증(hyperoxaluria;뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자분 4) 임부,수유부
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염등 위장질환이 있는환자분 6) 심장,순환기기능 장애 환자분
- 신장에 환자분 8) 저단백혈증 환자분 9) 간신택당증 투여중인 환자분 10) 담낭관련 질환,간질환환자분
- 위장관 질환 12) 급 만성 기관지염, 폐부종환자분 13)알칼리증, 소화성궤양

4. 부작용

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사는 약사와 상의 하십시오. 구역, 구토, 기어올름, 건조하고 거친피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 류마염, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 열골절이오름, 삼각통풍류, 두드러기, 광선과민증, 복부 위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부통증, 알레르기반응, 편두통, 관절통, 호산구증가, 요오드중독증상, 흉만, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 과칼혈증, 가슴작, 위장통증, 피부염, 말 호흡기 약화, 말도, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 약이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성, 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy; 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 임신이 부족한 환자분에게 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment; 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 경기투여에 의해 고칼혈혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법, 용량을 지키십시오.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민A로서 1일 5,000IU 이상 넘지 않도록 하십시오.

6. 상호작용

- 항말도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼혈혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
 - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파

7. 독차, 흡차 등 탄원을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

8. 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 외국에서 임신전 3개월로부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정 된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울여십시오.
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼혈혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 임신, 수유중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장애 및 갑상선증을 유발할 수 있습니다.

9. 임상검사치에의 영향

- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

10. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【포장단위】 자사포장(외부용기에 표시, 90정)당위 일니다.

【사용기간】 제조일로부터 36개월 일니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다.

민약 구입시 유효(사용)기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재검제부고시(소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자 상담전화 : 080-550-8308~9



주식 대웅제약
경기도 화성시 함남면 삼신리 908-10

설명서 작성년월일 : 2005.10.06.
제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.