

말초순환기능장애 및 근육경련 개선

토코그린 연질캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	315 비타민E 및 K 제
-------------	-------------------

토코그린 연질캡슐은 비타민 E(토코페롤)와 마그네슘을 함유한 제품으로 간혈성 파행증이나 동상 등으로 인한 말초순환기능장애와 배란장애와 같은 내분비기능장애를 가지신 분들에게 보조요법으로써 도움을 드립니다. 또한 불규칙한 식생활이나 스트레스 환경오염등으로 인하여 결핍등으로 나타날 수 있는 비타민-E 결핍증과 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련을 개선시켜 드립니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐중

초산토코페롤(약전)	500mg (비타민E로서 500 I.U.)
산화마그네슘(약전)	250mg (마그네슘으로서 150.8mg)

【성상】

미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능 및 효과】

말초순환기능장애(간혈성 파행증, 동상 등)의 보조요법, 내분비기능장애(배란장애)의 보조요법, 비타민-E 결핍증, 마그네슘결핍으로 인한 근육경련개선

【용법 및 용량】

18세 이상의 성인 : 1일2회, 1회1캡슐

【사용상의 주의사항】

- 다음의 경우에는 신중히 투여할 것
 - 혈전증에 대한 소인을 가진 환자 또는 에스트로겐 복용환자에게 혈전증 발생의 위험이 증가할 수도 있다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부는 의사나 약사와 상의할 것.
- 다음의 경우에는 투여하지 말 것
중증의 신부전 환자
- 부작용
 - 설사, 변비 또는 위부불쾌감의 증상이 나타날 수 있다.
 - 드물게 발진이 나타날 수 있다.
 - 장기복용시 구역, 피로, 두통 및 시야혼탁이 보고된 바 있다.
 - 1일 비타민-E 1300IU 이상 복용시 위장관손상, 생식선 기능저하 및 크레아틴뇨증이 보고된 바 있다.
 - 마그네슘용량의 증가로 인해 경미한 배변작용이 생길 수 있다.
 - 고용량과 장시간 투여에 의해 피로가 발생할 수 있다.
- 복용할 때 다음 사항에 주의할 것
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 어린이가 복용하지 않도록 주의할 것
- 상호작용
 - 고용량 복용시 체내에 저장된 비타민 A를 고갈시키고, 비타민 K의 흡수 및 작용을 저해할 수 있다.
 - 테트라사이클린과 동시에 복용할 경우 상호간에 흡수가 저하될 수 있다.
 - 인산염, 칼슘염제제는 마그네슘의 흡수에 영향을 줄 수 있다.
 - 철의 흡수는 마그네슘에 의해 저하될 수 있다.
 - 철제제와 동시투여에 의해 비타민-E의 작용이 감소될 수 있다.
 - 콜레스테라민과 유동파라핀은 함께 다른 지용성 비타민의 흡수를 감소시킬 수 있다.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것
 - 오용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

【포장단위】

90연질캡슐, 180연질캡슐

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【제품문의처】

080-424-7999

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 재정경제부 고시에 의거 보상받을 수 있습니다.
(만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손 된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

31307888

※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
3. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼가 할 것.
4. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의 할 것

설명서 개정연월 : 2006. 06.

제조원

Hanmi 한미약품(주)

경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

판매원

Hanmi 한미FT(주)

서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.