

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

아세트아미노펜(약전) 60mg

염산에페드린(약전) 25mg

무수카페인(약전) 25mg

아스코르빈산 97% 과립(별규) 171.2mg

(아스코르빈산으로 166mg)

【효능 및 효과】 감기의 증상(인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 권태감, 근육통)의 완화

【용법 및 용량】 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】


1. 다음 사항은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 중이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 권태감, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 열유아 및 14세 이하의 어린이
 - 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 7) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
 - 1) 용법·용량을 잘 지켜 것
 - 2) 다른 약물과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등

KGMP

일반의약품
분류번호: 114

에카민-C정

Ecamine-C Tab.



500정

- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것
- 4) 3개월 미만의 영아에게는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 천기종 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 3) 장기간용 하지 말 것

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 물수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오물을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온 (1~30℃)보관

【판 매 원】 (주)덕터스에디라임 서울시 서초구 방배동 765-14

상당 및 문의전화: 080-058-0588

【제 조 원】 한국콜마 제약사업부

충남 연기군 전의면 신정리 618-3

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 제품 적성(계절)연필 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kolmarpharm.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:



K061202