

알부민·로알젤리 함유 - 고단위 종합영양제

알부타민

연질
캡슐

ALBUTAMIN soft cap.

【원료약품의 분량(1캡슐 중)】

로알젤리(KPC)	20mg
(10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.8mg)	
초산토크페롤(KP)	45IU
아스코르빈산(KP)	100mg
염산치아민(KP)	5mg
리보플라빈(KP)	2mg
염산피리독신(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	12 μ g
니코틴산아미드(KP)	40mg
건조난백분말(별규)	200mg
식약청인정타르색소(청색1호, 황색5호, 적색40호)(KPTaCS)	적량

【성상】

황갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음의 경우의 비타민 B1, B2, B6, B12, C, E의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 시, 노년기
2. 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화
어깨·목결림, 수족저림·수족냉증

【용법·용량】

8세 이상의 어린이 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고
로알젤리가 함유된 제제 사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상 등의 부작용이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로, 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 말 것.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 3개월 미만의 영아
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 과수산노증환자(Hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부, 수유부

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.(구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전 증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경변 또는 신경병적 증상(Neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(Glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과산화혈증(Hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것.
- 3) 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용할 것.

6. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 말 것 : 레보도파

7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사 시 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 가능한 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
- 3) 오·남용을 막고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【 저장방법 】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【 사용기간 】

제조일로부터 36개월

【 포장단위 】

자사 포장단위

【 판 매 원 】 상아제약주식회사

경기도 용인시 기흥구 보정동 303

【 제 조 원 】 (주)헤파가드

충북 충주시 주덕읍 당우리 809

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품으로서 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질·변색 또는
오손된 제품을 구입하셨을 경우 구입한 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 올바른 사용법을 모르실 경우 의사, 약사와 상의하십시오.

문안개정일: 2008. 03. 24