

비타민 · 미네랄제제

10 정

비 타 콤 비

정

정 부 공 인

K G M P

우 수 의 약 품

적 격 업 체 제 품

500

비타민C
500mg 함유

피로회복
체력저하
신경통
구내염 · 구순염
잇몸출혈 · 비출혈예방



Arlico+

(주)한국알리코팜

충북 청천군 광혜원면 화죽리 160-17

<http://www.arlico.co.kr>

● 용법 · 용량 성인 1회 1정, 1일 1회 복용

● 성 상 갈색의 장방형 필름코팅정

● 저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (주의-부작용)



8 806112 406998

●효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, B₁₂, C의 보급 :
육체피로, 병중·병후의 체력저하, 임신·수유기, 노년기
2. 아연의 보급
3. 각기, 눈의 피로
4. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
5. 다음 증상의 완화 : 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
6. 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화,
잇몸출혈·비출혈 예방

●사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증환자(Hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
3. 이상반응
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사, 물은변, 식욕부진, 복부팽만감, 위장장애, 소화장애, 상복부 통증, 저혈압, 폐부종 등 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수도 있으며, 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가 될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음 약물과 병용투여하지 않는다. : 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의 사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

●소비자 상담실 : 080-585-0004

●성분·함량 : 1정 중

초산토코페롤 50%(KPC)..... 20mg
(비타민E로서 10 IU)
직타용아스코르빈산(97%)(별규)··· 515.46mg
(아스코르빈산으로서 500mg)

엽산(약전)..... 0.4mg
질산치아민(약전)..... 25mg
리보플라빈(약전)..... 12mg
니코틴산아미드(약전)..... 100mg
엽산피리독신(약전)..... 10mg

시아노코발라민(약전)..... 0.012mg
판토텐산칼슘(약전)..... 30mg
황산아연(USP) 41.17mg
(아연으로서 15mg)