

푸푸에프 연질캡슐

POOPOO-F Soft Capsule

감기는 바이러스에 의한 상기도감염으로 상기도의 표면, 즉 점막에 몇 가지 바이러스가 감염되어 염증이 있는 상태를 말합니다. 이 때의 증상은 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 발열, 근육통, 기침 등이 있고 목소리가 변하기도 합니다. 특히 기침감기 시에는 재채기 및 기침과 함께 콧물, 코막힘, 두통, 가래, 천식의 증상을 수반합니다. 이 때는 따뜻한 물을 자주 마시며 충분한 휴식 및 수면을 취합니다. 또한 신속하고 적절한 치료법으로 초기에 치료하는 것이 중요합니다.

푸푸에프 연질캡슐은 항히스타민제, 비충혈제거제, 거담제, 진해제가 복합처방 되어 있어서 기침감기에 신속하고 효과적인 약효를 나타냅니다.

【원료약품 및 그분량】

1캡슐(1,290mg) 중	
말레인산클로르페니라민(약전)	4.0mg
d-염산에칠에페드린(약전)	25.0mg
구아이페네신(약전)	100.0mg
브로화수소산텍스트로메트르핀(약전)	20.0mg

【성상】

무색 또는 옅은 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

기침, 가래, 천식

【용법·용량】

성인 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 환자
- 2) 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절염, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
- 4) 심장에 및 고혈압 환자, 고령자
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등)환자, 배뇨장애 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 상호작용

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여하지 마십시오.

5. 소아에 대한 투여

7세 이하의 영유아에는 시럽제를 투여하십시오.

6. 저장시 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10연질캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 재정경제부고시 소비자 피해보상규정에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소비자 상담실 : 02)568-0051
- 반품 및 교환처 : 02)525-0725

개정일 2005. 10

경기도 화성시 향남면 상신리 906-6
알앤피코리아(주)
최대용제약 계열사