



잇몸질환치료제

덴타자임

캡슐

분류번호 : 231(치과구강용약)


덴타자임캡슐은 잇몸출혈, 부기, 통증에 효과적인 염화리소짐 및 카르바조크롬과 비타민 C, E가 이상적으로 배합되어 붓고 피나는 잇몸병에 효과적인 잇몸질환 치료제입니다. 염화리소짐은 잇몸질환의 주원인균에 대한 항균작용으로 염증을 억제하고 카르바조크롬과 비타민 C, E는 모세혈관의 저항성을 높여 잇몸출혈을 억제합니다. 또한 혈액순환을 촉진시켜 발적 및 부종 증상을 완화시키고 손상된 잇몸조직을 재생시켜 치은염, 치조농루에 의한 잇몸질환을 개선합니다.

성분 · 함량 1캡슐 중

제피아스코르빈산(식약청고시)	156.3mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
염화리소짐(식약청고시)	30mg(역가)
카르바조크롬(식약청고시)	2mg
초산토코페롤50%(식약청고시)	10mg
(dl- α -초산토코페롤로서 5mg)	

성상 주황색의 가루가 든 상하부 노란색의 경질캡슐

효능 · 효과 치은염, 치조농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화



용법 · 용량 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.



- ※ 그림과 같이 캡슐포장의 볼록한 부분을 화살표방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자는 신중히 복용하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 복용 하고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항



- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.



- 3) 잘못된 사용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 240캡슐(120캡슐 × 2)

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시에 “소비자피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2006년 12월 4일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188) 또는 홈페이지(www.yuhan.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부포장에 표기되어 있습니다.



제조판매원

유한양행

본사:서울시 동작구 대방동 49-6
공장:충북 청원군 오창면 양청리 807-1

www.yuhan.co.kr

대표전화 : 02-828-0181

소비자상담실 : 080-024-1188

(수신자 요금부담)