

韓新 콜펜-에스정

일반의약품
분류번호: 114

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

현재 우리가 살고 있는 이 세상은 복잡다단하게 얽혀져 있다. 그로인한 환경이나 여건으로 질병의 요인도 다변화하고 있는 추세이다.

이 시대에 부응하여 우리고유의 생약처방에다 양약을 배합함으로써 상승효과를 나타내는 한신 콜펜-에스정을 개발하게 되었다. 생약 연구에 고도의 기술력을 발휘하여 이상적으로 배합한 제품으로써 감기로 인한 여러증상을 신속하게 치료해 줄 것이다.

【원료약품 및 그분량】1정(900mg)중.

아세트아미노펜(약전)	150.0mg
카 페 인(약전)	25.0mg
에 텐 자 미 드(약전)	250.0mg
감 초 가 루(약전)	125.0mg
	(글리시리진산으로서 3.1mg)
작 약 가 루(약전)	125.0mg
	(패오니플로린으로서 2.5mg)

【성 상】갈색의 타원형 필름코팅정.

- 【용법/용량】 1. 성인 : 1회2정, 1일 2회까지 공복시를 피하여 복용하십시오
복용간격은 6시간 이상으로 하십시오.
2. 어린이 1회 : 11~14세 1½정, 7~10세 1정.

- 【효능/효과】 1. 두통, 치통, 발치후 동통, 인후통, 귀의 통증, 신경통, 관절통, 근육통, 요통, 건통, 타박통, 골절통, 염좌통, 월경통(생리통), 외상통의 통증. 2. 오한, 발열시의 해열

【사용상의 주의사항】

1. 경고. 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. 2. 다음 사람은 복용하지 말 것. 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술)을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람 3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것. 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 3) 부종이 있는 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자 5) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 6) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예:발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 7) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이 8) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사

람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 9) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 10) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위 알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. 5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것. 1) 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것(다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등). 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것. 6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것. 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것. 2) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 4) 장기연용하지 말 것. 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ① 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함등과 함께 안색이 창백해지고 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③ 천식이 나타난 경우 6) 바르비탈계 약물, 심하게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 7. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.(사용후 반드시 밀폐 보관할 것) 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법/사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월.

【포장단위】 1포(2정)×6포, 6포×40개입.

*본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



주식
회사

한 국 신 약

본사/공장: 충남 논산시 양촌면 중산리 805-15 TEL: (041)740-2345
http://www.hsp.co.kr

08042004