

K.G.M.P

우수의약품지정업체

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

셀레늄함유건조효모(식품의약품안전청고시) 92.6mg

(셀레늄으로서 50 μ g)

크롬함유건조효모(식품의약품안전청고시) 100mg

(크롬으로서 50 μ g)

아스코르빈산(약전) 50mg

【성상】

미황색 유상물질이 들어있는 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

고혈압의 저하 및 예방

【용법·용량】

성인 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

「주의-부작용」

【저장방법 및 사용기간】

차광기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질,
변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한
약국에서 교환하여 드립니다.

제조번호 :

사용기한 :

셀크롬 연질캡슐

Selchromium Softcap.

MEDILINE

200캡슐

Binex SINCE 1957 (주) 바이넥스
서울특별시 영등포구 영등포동 1가 92-2
공정 : 부산광역시 시하구 장림동 480-2

일반의약품
분류번호 219

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말것.
구성성분에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
3. 부작용
구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는
투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3) 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70~150 μ g이고,
200 μ g 이상 투여하면 독성이 나타날 수 있으므로
200 μ g 이상 투여하지 않는다.
5. 임상검사치에의 영향
각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한
곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에
바꾸어 넣지 않는다.

http://www.bi-nex.com
TEL:080-263-3151



8 806052 474057