

코감기 전문치료제
도브콜정
Dove Call Tabs.

감기의 초기증상으로 두통, 콧물, 재채기 등의 증상이 가장 많이 나타납니다. 도브콜정은 해열진통제 아세트아미노펜(1정당 500mg)에 비충혈 제거제 염산슈도 에페드린과 항히스타민제 말레인산클로르페니라민을 복합하여 콧물, 코막힘, 재채기 등에 탁월한 효과를 나타내는 콧물 감기약입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중

아세트아미노펜 (약전).....	500밀리그램
염산슈도 에페드린(usp).....	30밀리그램
말레인산클로르페니라민 (약전).....	2밀리그램

【성상】

얇은 청색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 어린이: 매 6시간 마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 하고, 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 사람은 복용하지 말 것.
 - 1)지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 2)지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1)본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2)지금까지 이 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3)수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 4)간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 5)녹내장(예: 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 6)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 7)의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
 - 1)용법·용량을 잘 지킬 것

2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것

: 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등

3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것

4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우는 1세미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것

① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

③ 천식이 나타난 경우

6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것

3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것

4) 장기 복용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지말 것

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관,

· 사용기간: 3년

【포장방법】 자사포장단위



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담: 031)494-5995

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부서 작성일자(WA04.12.01) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로문의하시면 확인할 수 있습니다.