

필수 아미노산, 비타민 함유 복합 영양제

아미노픽정

Amino-p

●허약체질 ●육체피로 ●임신수유기

성
성분 · 함량

이 약은 녹색의 장방형 필름코팅정입니다.

이 약 1정 중

L-로이신(KP)	17mg
L-메치오닌(KP)	15mg
L-발린(KP)	15mg
L-이소로이신(KP)	15mg
L-트레오닌(KP)	10mg
L-페닐알라닌(KP)	10mg
L-트리프토판(KP)	5mg
염산L-리신(KP)	18.75mg
염산L-아르기닌(KP)	10mg
질산치아민(KP)	5mg
호박산토코페롤칼슘(KP)	25mg
리보플라빈(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
염산피리독신(KP)	7.5mg

효능 · 효과

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 위장장애, 영양장애, 발열성소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

용법 · 용량

15세 이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용하십시오.
소아(7~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용하십시오.사 용 상 의
주 의 사 항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 중증의 신부전환자
 - 7세 미만 소아
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 · 수유부
- 부작용
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
-위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변
 - 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.

가) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오. 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용하십시오.(품질유지를 위함)
- 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.

포 장 단 위

120, 240정

저 장 방 법

차광기밀용기, 실온(1~30°C)에 보관하십시오.

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 지점이나 사무소를 통해 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 “소비자피해보상규정”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

P0707-01