

만성질환자를 위한 복용안내

1. 성분명

metformin

2. 약품

다이하벡스정

(메트폴민)

3. 효능

(당뇨약)

제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D12 (식사와 함께 또는 식사 직후 복용)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

5. 복용안내

식사와 함께 또는 식사 직후 복용하는 것이 좋습니다.

설사, 변비, 구토, 식욕부진, 소화불량 등 위장장애가 나타날 수 있습니다.

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

드물지만 극도의 피로, 근육통, 호흡곤란, 복부 통증, 체온저하, 저혈압 증상이 나타날 경우 복용을 중단하고 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

정기적으로 검진하며, 새로운 수술이나 검사를 받게 될 경우 이 약을 복용함을 미리 알립니다.

6. 만성질환자를 위한 안내

[당뇨병 환자를 위한 안내]

※ 당뇨병이 조절되지 않을 경우 심부전, 혈관질환, 안과질환, 신장질환 등의 합병증이 생길 수 있으므로 약물을 지속적으로 복용하는 것이 중요합니다.

※ 생활습관 관리

- 규칙적인 식사습관, 금연·금주 및 운동요법을 병행합니다.

- 당뇨 환자의 상처에는 세균이 쉽게 침범하므로 매일 한 번씩 발의 상태를 점검하고 위생과 보호에 특히 유의합니다.

※ 식은땀, 두통, 떨림, 시야흐림, 피로감 등의 저혈당 증상이 나타나면 사탕, 과일주스, 설탕 등을 복용합니다. 15분이 되어도 증상이 계속되면 반복하여 섭취하고, 그래도 저혈당 증상이 지속되는 경우 즉시 병원에 가도록 합니다.