



제형별 그림 복약안내

성분명	tobramycin	제형	점안액
효능	(아미노글리코사이드계 항생제) 항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약		
사용방법	 <p>1) 오염 및 감염을 예방하기 위해 손을 깨끗이 씻습니다.</p>  <p>2) 고개를 뒤로 젖히거나 눕습니다.</p>  <p>3) 아래 눈꺼풀을 당겨 약액공간을 만든 후 약액의 지시된 양을 넣습니다.</p>  <p>4) 눈을 감고 비루관을 1~2분간 눌러줍니다.</p>  <p>5) 눈을 2-3회 깜박거리 약액이 눈 안에 고루 퍼지게 합니다.</p>		
주의사항	<p>약물의 오염을 막기 위해 용기의 끝이 눈에 직접 닿지 않게 하고, 점안액을 다른 사람과 함께 사용하지 않습니다.</p> <p>냉장 보관하는 점안액은 온도가 낮으면 자극감을 일으킬 수 있으므로 1-2분 용기를 쥐어 약액의 온도가 체온과 비슷하게 합니다.</p> <p>2종류 이상 점안 시 3~5분 투약간격을 둡니다.</p> <p>개봉 후 4주 이내에만 사용합니다.</p>		