

임부/수유부를 위한 복용안내

1. 성분명

cetirizine

2. 약품

지르텍정, 지르텍액
(세티리진)

3. 효능

(항히스타민제)

알레르기성 비염, 두드러기, 가려움 등의 증상을 완화하는 약

4. 주의사항

D04 (취침 전에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

C04 (졸릴 수 있어요)

5. 복용안내

취침전에 복용하는 것이 좋습니다.

입마름이 나타날 경우 무가당사탕이나 껌을 섭취하면 도움이 됩니다.

드물게 졸음, 두통이 나타날 수 있으므로 약 복용 초기에 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.