

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

dexibuprofen

2. 약품

덱시펜정

(덱시부프로펜)

3. 효능

(해열진통소염제)

비스테로이드성 소염진통제로 발열, 통증, 염증을 치료하는 약

4. 주의사항

D12 (식사와 함께 또는 식사 직후 복용)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

P12 (임신 • 임신 계획 시 먹지 마세요)

5. 복약안내

위장장애가 나타날 수 있으므로 음식과 함께 복용합니다.

음주에 의해 위장출혈이 발생할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

심혈관계 질환의 위험(혈압상승, 심계항진 등)이 있어 주의가 필요합니다.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 미리 알립니다.

드물지만 소변량 감소, 흑변, 알러지 반응(가려움증, 얼굴과 손의 부종, 숨참, 흉통)이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 알려진 바가 없으나 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없어 임신 중 사용을 권장하지 않습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.