

임부/수유부를 위한 복용안내

1. 성분명

felodipine

2. 약품

스프렌딜지속정

(펠로디핀)

3. 효능

(혈압강하제)

관상동맥 및 말초혈관을 확장시켜 고혈압과 협심증을 치료하는 약

4. 주의사항

D16 (매일 같은 시간에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

E02 (천천히 일어나세요)

I02 (자몽주스 X)

5. 복용안내

서방형 정제의 경우 씹거나 부수지 않고 물과 함께 그대로 삼킵니다.

어지러움, 현기증이 나타날 수 있으므로 앉거나 누웠다가 일어날 때 천천히 일어납니다.

초기에 손, 다리, 발등이 부을 수 있으며, 심할 경우 의사나 약사와 상담합니다.

일시적으로 혈관 확장에 의한 홍조가 발생할 수 있으며, 지속될 경우 의사나 약사와 상담합니다.

드물지만 잇몸이 붓는 등 잇몸 이상이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알려, 평소에 입안을 청결히 관리합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C입니다. FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유익성이 잠재적 위험

정보다 클 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.