

## 임부/수유부를 위한 복약안내

### 1. 성분명

metformin

### 2. 약품

다이하벡스정

(메트폴민)

### 3. 효능

(당뇨약)

제 2형 당뇨병을 치료하는 약

### 4. 주의사항

D12 (식사와 함께 또는 식사 직후 복용)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

### 5. 복약안내

식사와 함께 또는 식사 직후 복용하는 것이 좋습니다.

설사, 변비, 구토, 식욕부진, 소화불량 등 위장장애가 나타날 수 있습니다.

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

드물지만 극도의 피로, 근육통, 호흡곤란, 복부 통증, 체온저하, 저혈압 증상이 나타날 경우 복용을 중단하고 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

정기적으로 검진하며, 새로운 수술이나 검사를 받게 될 경우 이 약을 복용함을 미리 알립니다.

### 6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

## 7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.