

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

pranlukast

2. 약품

오논캡셀, 씨투스현탁정, 프란캡슐, 프라카논정
(프란루카스트)

3. 효능

(알레르기질환 치료제)

기관지천식 및 알레르기비염의 치료에 사용되는 약

4. 주의사항

D14 (식후에 복용하세요)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

C04 (졸릴 수 있어요)

C03 (어지러울 수 있어요)

5. 복약안내

1일 2회 아침, 저녁 식후에 복용합니다.

소화불량, 복부팽만, 설사, 구역 등의 위장장애가 나타날 수 있습니다.

두통, 졸음 어지러움이 나타날 수 있습니다.

천식 환자의 경우 증상이 없더라도 매일 복용합니다.

약의 효과가 불충분할 시 임의로 복용을 중단하거나 용량을 변경하지 않고 의사나 약사와 상담합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 알려진 바가 없습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을

상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.