

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

risedronate

2. 약품

악토넬정

(리세드론산나트륨)

3. 효능

(골대사관련약물)

파골세포의 뼈 용출을 저해하여 골다공증의 치료와 예방에 사용하는 약

4. 주의사항

C01 (충분한 물과 함께 드세요)

D11 (공복에 복용하세요)

P06 (복용 후 눕지 마세요)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

5. 복약안내

충분한 물(170~230 mL)과 함께 공복에 복용하며, 최소 30분간 눕지 않습니다.

다른 약물(칼슘보충제, 제산제 등) 및 음식물, 음료수와 최소 2시간 간격을 두고 복용합니다.

소화불량, 가슴쓰림, 복통 등 위장장애가 나타날 수 있으며 지속될 경우 의사나 약사에게 알립니다.

뼈(특히 턱), 관절 및 근육의 통증이 나타날 수 있으며, 침습적 치과 수술이 필요한 경우 반드시 의사에게 알립니다.

식이섭취가 적절하지 않은 환자는 칼슘, 비타민 D 등을 보충하여야 합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C입니다. FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유익성이 잠재적 위험

정보다 클 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.