

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

sitagliptin

2. 약품명

자누비아정

(시타글립틴)

3. 효능

(경구용 혈당강하제)

인슐린 생산 촉진, 글루카곤 생산 억제를 통해 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D16 (매일 같은 시간에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

5. 복약안내

식사와 관계없이 매일 같은 시간에 복용합니다.

음주에 의해 이 약의 혈당강하작용이 강화되고 지속될 수 있으므로 피합니다.
급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을
복용합니다.

드물지만 복통, 요통 등의 심한 통증이 나타나면 즉시 의사나 약사에게 알립니
다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태
아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위험
성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.