

## 임부/수유부를 위한 복약안내

### 1. 성분명

tobramycin

### 2. 약품

토라빈점안액, 토라빈안연고  
(토브라마이신)

### 3. 효능

(아미노글리코사이드계 항생제)  
항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약

### 4. 주의사항

F08 (눈에 넣는 약)  
C09 (바르기 전후 손을 씻으세요)  
신규3 (용기입구 접촉 X)  
신규2 (렌즈착용하지 마세요)

### 5. 복약안내

눈에 가려움, 부종, 결막염이 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.  
이 약을 사용하는 동안에는 콘택트렌즈를 착용하지 않습니다.  
다른 점안제와 병용하는 경우 적어도 5분 이상 간격을 두고 투여합니다.  
개봉 후 4주 이내에만 사용합니다.

### 6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.  
※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

### 7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을

상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.