



## 전문가를 위한 상세 복용안내

### 1. 성분명

chlorpheniramine

### 2. 효능

(항히스타민제)

위장관, 혈관, 호흡기계에 위치한 H<sub>1</sub>-수용체에 histamine과 경쟁적으로 길항하여 두드러기, 비염 등의 알러지 증상 및 코감기에 의한 재채기, 콧물, 기침 등의 증상의 완화에 사용하는 약입니다. 벌레에 물렸거나 벌에 쏘였을 때의 가려움증에 사용할 수도 있습니다.

### 3. 용량 및 용법

정제

○ 성인 (12세 이상)

1) 1회 2-6mg, 1일 2-4회, 최대용량 1일 24mg

○ 소아 (6-11세)

1) 1회 2mg, 1일 4-6회, 최대용량 1일 12mg

일반적으로 식후 또는 취침전에 복용합니다.

술이나 중추신경억제제의 병용을 피합니다.

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야할 사항

이 약물 및 유사 물질에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

녹내장, 전립선비대증, MAO저해제 복용 중, 안내압상승, 갑상선기능항진증, 간질, 소화기계질환, 순환기계질환, 심혈관계 질환, 기관지질환, 간질환의 경우 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

호흡곤란, 흉부불쾌감, 황달, 혈압 상승 또는 저하, 경련, 착란, 빈혈, 발진, 두드러기 등 피부발진, 근허약, 배뇨장애

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 졸음, 어지러움, 진정: 졸음이나 어지러움, 진정이 나타날 수 있으므로 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.
- 입마름: 입마름이 나타날 경우 무가당사탕이나 껌을 섭취하면 도움이 됩니다.
- 위장장애: 소화불량, 식욕부진, 복통, 설사, 변비 등의 위장장애가 나타날 수 있습니다.
- 배뇨장애가 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.
- 코 또는 기도의 건조 등 호흡기계 증상
- 신경염, 오한, 월경이상

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

## 6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

phenytoin, 중추신경억제제

○ 음식

음주에 의해 약물의 효과나 부작용이 과도해 질 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

## 7. 사용 시 주의사항

졸음이나 어지러움, 진정이 나타날 수 있으므로 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

알코올 및 졸음을 유발하는 약(감기약, 알러지약, 근이완제, 신경안정제, 수면제, 강한 진통제 등)에 의해 졸음 등의 부작용이 과도해 질 수 있습니다.

## 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

## 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

## 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.