



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

felodipine

2. 효능

(혈압강하제)

칼슘채널차단제로 심근과 평활근에 칼슘유입억제로 관상동맥 및 말초혈관을 확장시켜 고혈압과 협심증 치료에 사용됩니다.

3. 용량 및 용법

정제 및 서방형 정제

○ 성인

1) 고혈압, 협심증: 1회 5-10mg, 1일 1회, 최대용량 1일 20mg

서방형 정제의 경우 분할하거나 씹거나 부수어서 복용하지 않습니다.

음식과 함께 또는 따로 복용할 수 있으나, 흡수를 일정하게 유지하기 위해 가능하다면 따로 복용하는 것이 좋습니다.

매일 일정한 시간에 복용하고, 복용을 갑자기 중단하지 않도록 합니다.

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야할 사항

이 약에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

심장, 간, 신장질환이 있는 경우 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

발열, 발진, 가려움, 두드러기, 입술이나 혀가 붓는 경우

심계항진, 빈맥, 흉부압박감, 이외 협심증 증상의 악화

(특히, 투약 초기 혹은 증량 후 복용 30분 이내에 흉통이 나타난 경우)

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 기립성 저혈압: 약물 복용 초기 및 용량증량 시 어지러움, 현기증이 나타날

수 있으므로 앉거나 누웠다가 일어날 때 천천히 일어납니다.

- 안면홍조: 혈관 확장에 의한 홍조가 발생할 수 있으나, 일시적인 증상으로 복용을 지속하면 좋아집니다.

- 두통, 피로감: 약물 복용 초기 및 용량증량 시 두통, 피로감이 나타날 수 있습니다.

- 치육증식: 드물게 잇몸이 이상 증식하는 증상이 나타날 수 있는데, 평소 입안을 청결하게 관리함으로써 예방할 수 있으며, 발생 시에는 의사나 약사에게 알립니다.

- 부종: 투여 초기 2~3주, 투여량이 많은 경우 발목부종을 포함한 부종이 나타날 수 있습니다.

- 위장장애: 소화불량, 구역, 변비 등이 나타날 수 있습니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

다른 혈압강하제, metoprolol, digoxin, CYP3A4 유도제(carbamazepine, phenytoin, rifampicin 등), CYP3A4 저해제(cimetidine, erythromycin, itraconazole 등)

○ 음식

자몽 및 자몽주스에 의해 약물의 효과 및 유해반응이 강화될 수 있으므로 섭취를 피하는 것이 좋습니다.

음주에 의해 약물의 효과나 부작용이 과도해 질 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

7. 사용 시 주의사항

어지러움이 나타날 수 있습니다. 이 경우 운전, 기계조작 또는 위험한 작업을 삼갑니다.

보다 충분한 효과를 위해 증량이 필요할 때에는 적응을 위해 보통 2주이상의 간격을 두고 서서히 증량하게 됩니다. 또한 중단 시에도 증상이 악화될 수 있어 서서히 줄이게 되므로 복용을 갑자기 중단하지 않도록 합니다.

8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.