



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

pranlukast

### 2. 효능

(알레르기질환 치료제)

류코트리엔 조절제로서 비만세포를 안정화시켜 기관지천식 및 알레르기비염의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

#### 정제

○ 성인

1) 천식 및 알레르기비염: 1회 75mg, 1일 2회

#### 캡슐제

○ 성인

1) 천식 및 알레르기비염: 1회 225mg, 1일 2회

#### 현탁정 및 츠어블정

○ 소아

1) 천식 및 알레르기비염: 7mg/kg/day, 1일 2회 분할복용, 1일 최고용량 10mg/kg/day (단, 1일 최대용량 450mg)

<체중 당 1회 복용량>

12-18kg: 50mg, 18-25kg: 70mg, 25-35kg: 100mg, 35-45kg: 140mg

#### 건조시럽

1) 천식 및 알레르기비염: 7mg/kg/day, 1일 2회 분할복용,

1일 최고용량 10mg/kg/day (단, 1일 최대용량 450mg)

1일 2회 아침, 저녁 식후에 복용합니다.

현탁정의 경우 삼키거나 분할하여 복용하지 않으며, 소량의 물에 녹여서 복용합니다. 손가락에 소량의 물을 담고 이 약 1정을 넣어 정제가 봉해되도록 기

다린 후 복용하기 전에 저어서 신속히 복용합니다.

#### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

혈관염이 있는 경우 미리 알립니다.

#### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

발진 등의 과민증, 발열, 인후통, 전신권태감, 자반, 비출혈, 치육출혈 등의 출혈경향이 나타나는 경우

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 두통, 졸음 어지러움이 나타날 수 있습니다.

- 피부발진이 나타날 수 있습니다.

- 소화불량, 복부팽만, 설사, 구역 등의 위장장애가 나타날 수 있습니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

#### 6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

terfenadine, astemizole, itraconazole, erythromycin, ketoconazole

○ 음식

알려진 바 없습니다.

#### 7. 사용 시 주의사항

다른 류코트리엔 길항제를 투여 받은 환자에서 인과관계는 명확하지 않으나 우울증, 자살생각, 자살 및 공격적 행동 등의 정신 증상이 보고되었으므로 주의하여 사용합니다.

천식 환자의 경우 이 약은 이미 일어난 발작이나 증상을 신속하게 억제시키지 못하므로 예방 목적으로 사용하며, 증상이 없더라도 매일 복용합니다.

약의 효과가 불충분할 시 임의로 복용을 중단하거나 용량을 변경하지 않고 의

사나 약사와 상담합니다.

#### 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

#### 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

#### 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.