



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

ranitidine

2. 효능

(히스타민 H₂ 차단제)

위벽세포에 위치한 H₂-수용체에서 histamine을 경쟁적으로 길항하여 위산분비를 감소시켜 위궤양, 십이지장궤양, 위식도 역류질환과 같은 위산 분비 과다 상태를 예방, 치료하는 약입니다.

3. 용량 및 용법

정제

○ 성인 (16세 이상)

- 1) 위산과다, 속쓰림: 1회 75mg, 1일 1-2회, 최대용량 1일 150mg
- 2) 위·십이지장 궤양: 1회 150mg, 1일 1-2회, 최대용량 1일 300mg
- 3) 역류성 식도염: 1회 150mg, 1일 2-4회, 최대용량 1일 600mg

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물 및 유사 물질에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

신질환, 간질환, 급성 포르피린증 등을 앓고 있는 경우 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

호흡곤란, 두드러기, 어두운색 뇨, 소변량 감소, 빠르거나 느린 심박동, 위상부 통증, 이상출혈, 피부황변

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 변비, 설사, 복통, 두통, 가벼운 오심, 구토 등 소화기계 증상이 지속되는 경우 의사나 약사에게 알립니다.

- 어지러움, 졸음 등 정신신경계 증상: 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

ketoconazole, triazolam, sucralfate, antacids, itraconazole, ferrous sulfate, sulfonylureas

7. 사용 시 주의사항

커피, 알코올, 아스피린 등의 소염진통제 및 흡연은 속쓰림을 유발할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

항응고제와 동시에 투여 받은 환자의 경우 출혈경향이 증가할 수 있으므로 미리 의사나 약사에게 알립니다.

제산제, sucralfate는 이 약의 흡수에 영향을 주므로 이 약물 복용 2시간 전 또는 2시간 후 따로 복용합니다.

어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다. 이 경우 운전, 기계조작 또는 위험한 작업을 삼갑니다.

위·십이지장 궤양, 역류성 식도염 치료 시, 지시한 복용기간을 지키지 않는 경우 질환이 재발할 수 있으므로 지시된 복용법 및 복용기간을 준수합니다.

8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의

사나 약사와 상담합니다.