



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

sitagliptin

### 2. 효능

(경구용 혈당강하제)

혈중 당의 농도에 반응하여 인슐린의 생산을 촉진하고, 글루카곤의 생산을 억제하여 제 2형 당뇨병의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 1회 100mg, 1일 1회, 최대용량 1일 100mg

○ 신장장애 환자

1) 경증의 신장장애 환자: 용량조절이 필요하지 않습니다.

2) 중등도의 신장장애 환자: 1회 50mg, 1일 1회

3) 중증의 신장장애 환자: 1회 25mg, 1일 1회

이 약은 음식과 상관없이 복용 가능합니다.

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

중증의 신장장애가 있는 경우 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

저혈당, 췌장염, 알러지 반응, 소변량과 빈도의 변화, 콧물

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 저혈당: 빈맥, 어지러움, 두통, 발한 등의 증상이 나타날 수 있으므로 사탕을 소지하고 다니도록 합니다.



처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.