



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

tobramycin

2. 효능

(아미노글리코사이드계 항생제)

이 약에 감수성이 있는 균의 단백질 합성을 저해하여 안검염, 누낭염, 다래끼, 결막염, 각막염, 각막궤양 등의 치료에 사용됩니다.

3. 용량 및 용법

점안액

○ 성인

1) 4시간마다 1~2방울

점안연고

○ 성인

1) 일반 감염: 1일 2~3회, 1회 약 1cm

2) 중증 감염: 3~4시간마다 약 1cm

지시한 복용법, 기간을 지키지 않는 경우 세균이 약에 대한 내성을 갖게 되어 치료가 더디고 감염이 재발할 수 있습니다.

전신 부작용 예방 및 약효 향상을 위해 점안 후 눈을 감고 비루관을 1~2분 눌러줍니다.

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물 또는 아미노글리코사이드계 항생제 또는 바시트라신에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

시력저하, 눈 통증

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 눈 자극감: 지속적으로 눈 자극감이 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

항응고제

7. 사용 시 주의사항

점안시 일시적인 시야불선명이 나타날 수 있으므로 시야가 선명해질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 피합니다.

감염균의 확산을 피하기 위해 치료 중에는 콘택트렌즈의 착용을 피합니다.

8. 사용을 잊은 경우

생각난 즉시 사용합니다. 만약 다음 사용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 사용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 사용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.