

## 고령자를 위한 복약안내

### 1. 성분명

dexibuprofen

### 2. 약품

덱시펜정

(덱시부프로펜)

### 3. 효능

(해열진통소염제)

비스테로이드성 소염진통제로 발열, 통증, 염증을 치료하는 약

### 4. 주의사항

D12 (식사와 함께 또는 식사 직후 복용)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

P12 (임신·임신 계획 시 먹지 마세요)

### 5. 복약안내

심혈관계 질환의 위험(혈압상승, 심계항진 등)이 있어 주의가 필요합니다.

드물지만 소변량 감소, 흑변, 알러지 반응(가려움증, 얼굴과 손의 부종, 숨참, 흉통)이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

### 6. 고령자를 위한 안내

※ 75세 초과 어르신의 경우 위장관 출혈 및 위궤양의 위험이 증가할 수 있으므로 장기간 복용은 피하며 위보호제와 함께 복용할 수 있습니다. 심부전, 신부전 및 위/십이지장 궤양 병력이 있는 어르신의 경우 그 증상이 더 악화될 수 있으므로 추천하지 않습니다. 전문가의 판단에 따라 사용합니다.

### 7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거

나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.