

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

esomeprazole

2. 약품

넥시움정

(에스오메프라졸)

3. 효능

(소화성궤양용제)

위산분비를 억제함으로써 위장관 질환을 치료하는 약

4. 주의사항

D13 (식전에 복용하세요)

p01 (쫄개지 마세요)

I04 (카페인 X)

I06 (흡연 · 알코올 X)

5. 복약안내

두통, 졸림, 현기증이 나타날 수 있습니다.

설사, 변비, 구역, 구토, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다.

장기간 사용시 골절, 위축성 위염, 설사가 나타날 수 있으므로 주의깊게 관찰합니다.

6. 고령자를 위한 안내

※ 어르신이 복용할 경우, 특히 고용량이나 장기간 복용할 경우 골절의 위험이 증가할 수 있으므로 면밀히 살펴야 하며 칼슘과 비타민 D 보충제의 사용이 권장됩니다.

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거

나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.