

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

felodipine

2. 약품

스프렌딜지속정

(펠로디핀)

3. 효능

(혈압강하제)

관상동맥 및 말초혈관을 확장시켜 고혈압과 협심증을 치료하는 약

4. 주의사항

D16 (매일 같은 시간에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

E02 (천천히 일어나세요)

I02 (자몽주스 X)

5. 복약안내

서방형 정제의 경우 씹거나 부수지 않고 물과 함께 그대로 삼킵니다.

초기에 손, 다리, 발등이 부을 수 있으며, 심할 경우 의사나 약사와 상담합니다.

일시적으로 혈관 확장에 의한 홍조가 발생할 수 있으며, 지속될 경우 의사나 약사와 상담합니다.

드물지만 잇몸이 붓는 등 잇몸 이상이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알려며, 평소에 입안을 청결히 관리합니다.

6. 고령자를 위한 안내

없음

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상

의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.