

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

metformin

2. 약품

다이하벡스정

(메트폴민)

3. 효능

(당뇨약)

제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D12 (식사와 함께 또는 식사 직후 복용)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

5. 복약안내

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

드물지만 극도의 피로, 근육통, 호흡곤란, 복부 통증, 체온저하, 저혈압 증상이 나타날 경우 복용을 중단하고 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

정기적으로 검진하며, 새로운 수술이나 검사를 받게 될 경우 이 약을 복용함을 미리 알립니다.

6. 고령자를 위한 안내

※ 신장기능이 좋지 않거나 80세 이상의 어르신인 경우 추천하지 않습니다. 전문가의 판단에 따라 사용합니다.

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.