

## 고령자를 위한 복약안내

### 1. 성분명

ranitidine

### 2. 약품

잔탁정

(라니티딘)

### 3. 효능

(소화성궤양용제)

위산분비를 줄임으로써 위장관 질환을 치료하는 약

### 4. 주의사항

C03 (어지러울 수 있어요)

C04 (졸릴 수 있어요)

I04 (카페인 X)

I06 (흡연, 알코올 X)

### 5. 복약안내

수크랄페이트에 의해 이 약의 흡수가 감소하므로 약 복용 전후 2시간 이내에는 병용하지 않습니다.

지시한 복용기간을 지키지 않는 경우 질환이 재발할 수 있으므로 지시된 복용법 및 복용기간을 준수합니다.

### 6. 고령자를 위한 안내

없음

### 7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운

경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.