

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

sitagliptin

2. 약품명

자누비아정

(시타글립틴)

3. 효능

(경구용 혈당강하제)

인슐린 생산 촉진, 글루카곤 생산 억제를 통해 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D16 (매일 같은 시간에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

5. 복약안내

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

드물지만 복통, 요통 등의 심한 통증이 나타나면 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 고령자를 위한 안내

없음

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운

경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.