

## 고령자를 위한 복약안내

### 1. 성분명

tobramycin

### 2. 약품

토라빈점안액, 토라빈안연고  
(토브라마이신)

### 3. 효능

(아미노글리코사이드계 항생제)  
항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약

### 4. 주의사항

F08 (눈에 넣는 약)  
C09 (바르기 전후 손을 씻으세요)  
신규3 (용기입구 접촉 X)  
신규2 (렌즈착용하지 마세요)

### 5. 복약안내

눈에 가려움, 부종, 결막염이 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.  
다른 점안제와 병용하는 경우 적어도 5분 이상 간격을 두고 투여합니다.  
개봉 후 4주 이내에만 사용합니다.

### 6. 고령자를 위한 안내

없음

### 7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음

복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.